

А. Л. Городенцев<sup>1</sup>

# Формальные степенные ряды, рекуррентные уравнения и суммирование степеней

Это записки занятий, которые я проводил в 57-й и 179-й московских школах и на летней школе в Дубне, а также лекции, прочитанной мною на малом мех-мате 25 апреля 2009 года. От участников не предполагалось никаких специальных познаний кроме умения (и известного желания) раскрывать скобки. Целью занятий было знакомство с исчислением формальных степенных рядов, разложением элементарных функций (включая бином с рациональным показателем) и обращением разностных операторов на пространстве многочленов. Встречающиеся в тексте упражнения призваны заменить происходившие в реальности диалоги преподавателя с аудиторией. Все они существенны для понимания и используются в дальнейшем.

## Содержание

|   |    |
|---|----|
| Содержание .....  | 1  |
| §1 Алгебраические операции над рядами и многочленами .....      | 2  |
| §2 Обращение многочленов и решение рекуррентных уравнений ..... | 3  |
| §3 Дифференциальное исчисление рядов .....                      | 6  |
| §4 Бином Ньютона .....  | 10 |
| §5 Вычисление степенных сумм .....                              | 13 |

Москва. Май 2009.

---

<sup>1</sup>Факультет математики ГУ – ВШЭ; Группа математической физики ИТЭФ; Независимый Московский университет; <mailto:gorod@itep.ru>; <http://wwwth.itep.ru/~gorod>

## §1. Алгебраические операции над рядами и многочленами.

**1.1. Степенные ряды и многочлены.** Мы будем заниматься бесконечными выражениями

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots \quad (1-1)$$

где  $x$  — переменная, а  $a_i$  — числа из некоторого *числового поля*  $\mathbb{F}$ . В качестве  $\mathbb{F}$  можно взять, например, поле рациональных чисел  $\mathbb{Q}$ , или поле действительных чисел  $\mathbb{R}$ , или поле комплексных чисел  $\mathbb{C}$  (если вы с ним знакомы). Всё, что нам потребуется от чисел — это возможность производить с ними четыре арифметических действия: сложение, вычитание, умножение и деление (на ненулевые числа), которые обладают теми же свойствами, что и действия над рациональными числами. Выражение (1-1) называется *формальным степенным рядом*. По определению, два ряда *равны*, если равны все их соответственные коэффициенты. Множество всех формальных степенных рядов с коэффициентами из числового поля  $\mathbb{F}$  обозначается  $\mathbb{F}[[x]]$ . Ряд, в котором только конечное число коэффициентов  $a_i$  отлично от нуля, называется *многочленом*. Множество всех многочленов обозначается через  $\mathbb{F}[x] \subset \mathbb{F}[[x]]$ . Номер последнего ненулевого коэффициента многочлена  $f \in \mathbb{F}[x]$  называется *степенью* этого многочлена и обозначается  $\deg(f)$ .

**1.2. Алгебраические операции над рядами.** Операция, сопоставляющая рядам  $f_1, f_2, \dots, f_n$  новый ряд  $g$ , называется *алгебраической*, если каждый коэффициент ряда  $g$  вычисляется конечным числом арифметических действий над конечным числом коэффициентов рядов  $f_1, f_2, \dots, f_n$ .

Например, сложение и умножение рядов, происходящие по обычным правилам раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых, это алгебраические операции. В самом деле, если

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots \\ g(x) &= b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots, \end{aligned} \quad (1-2)$$

то ряды  $f(x) + g(x) = s_0 + s_1x + s_2x^2 + \dots$  и  $f(x) \cdot g(x) = p_0 + p_1x + p_2x^2 + \dots$  имеют при  $x^m$  коэффициенты

$$s_m = a_m + b_m \quad \text{и} \quad p_m = a_0b_m + a_1b_{m-1} + \dots + a_{m-1}b_1 + a_mb_0 = \sum_{i=0}^m a_ib_{m-i}, \quad (1-3)$$

которые находятся конечным числом сложений и умножений конечного набора коэффициентов рядов  $f$  и  $g$ .

Напротив, подстановка вместо  $x$  ненулевого численного значения  $x = \alpha \in \mathbb{F}$  алгебраической операцией не является, поскольку «вычисление значения»  $f(\alpha)$  при  $\alpha \neq 0$  для ряда  $f$  с бесконечным множеством ненулевых коэффициентов может потребовать бесконечно много сложений ненулевых чисел. Только значение  $x = 0$  заведомо можно подставить в любой ряд, и результатом такой подстановки будет свободный член этого ряда.

А вот подстановка в ряд  $f(x)$  вместо  $x$  другого ряда  $g(x) = b_1x + b_2x^2 + \dots$  *без свободного члена* является алгебраической операцией, поскольку в результате такой подстановки получится ряд

$$\begin{aligned} f(g(x)) &= \sum_{k \geq 0} a_k (b_1x + b_2x^2 + \dots)^k = \\ &= a_0 + a_1(b_1x + b_2x^2 + \dots) + a_2(b_1x + b_2x^2 + \dots)^2 + a_3(b_1x + b_2x^2 + \dots)^3 + \dots = \\ &= a_0 + (a_1b_1) \cdot x + (a_1b_2 + a_2b_1^2) \cdot x^2 + (a_1b_3 + 2a_2b_1b_2 + a_3b_1^3) \cdot x^3 + \dots, \end{aligned}$$

в котором на коэффициент при  $x^m$  оказывают влияние только первые  $m$  слагаемых (все последующие делятся на  $x^{m+1}$ ), причём в каждом из них вклад в коэффициент при  $x^m$  вносит лишь конечное число начальных членов.



коэффициентами которого являются числа Фибоначчи. Выполнение для всех  $k \geq 2$  соотношения  $u_k - u_{k-1} - u_{k-2} = 0$  равносильно тому, что у произведения рядов

$$(1 - x - x^2) \cdot (u_0 + u_1x + u_2x^2 + u_3x^3 + u_4x^4 + \dots) \quad (2-1)$$

обращаются в нуль коэффициенты при всех степенях  $x^k$  с  $k \geq 2$ . А поскольку  $u_0 = 0$  и  $u_1 = 1$ , это произведение равно  $x$ . Таким образом,

$$u(x) = u_0 + u_1x + u_2x^2 + u_3x^3 + u_4x^4 + \dots = \frac{x}{1 - x - x^2}, \quad (2-2)$$

и отыскание явной формулы для  $k$ -того числа Фибоначчи равносильно развертыванию правой части этой формулы в степенной ряд. Для этого разложим её знаменатель на множители.

Упражнение 2.1. Пусть квадратный трёхчлен  $t^2 + pt + q$  имеет корни  $a$  и  $b$ , так что  $t^2 + pt + q = (t-a)(t-b)$ .

Убедитесь, что тогда  $1 + px + qx^2 = (1 - ax)(1 - bx)$ .

Корнями трёхчлена  $t^2 - t - 1$  являются числа  $a = (1 + \sqrt{5})/2$  и  $b = (1 - \sqrt{5})/2$ , и по упр. 2.1

$$\frac{x}{1 - x - x^2} = \frac{x}{(1 - ax)(1 - bx)}.$$

Эту дробь можно разложить в сумму двух дробей с линейными знаменателями:

$$\frac{x}{(1 - ax)(1 - bx)} = \frac{\alpha}{1 - ax} + \frac{\beta}{1 - bx}, \quad (2-3)$$

где  $\alpha$  и  $\beta$  — некоторые константы, которые мы сейчас найдём. В самом деле, равенство (2-3) равносильно равенству

$$x = \alpha(1 - bx) + \beta(1 - ax)$$

между двумя линейными многочленами, и для того, чтобы оно выполнялось тождественно по  $x$ , достаточно добиться его выполнения для каких-нибудь двух численных значений  $x$ .

Подставляя  $x = 1/a$ , получаем  $\alpha = 1/(a - b)$ , а подставляя  $x = 1/b$ , получаем  $\beta = -1/(a - b)$ .

Таким образом, правая часть (2-2) является разностью двух геометрических прогрессий:

$$\frac{x}{(1 - ax)(1 - bx)} = \frac{1}{(a - b)} \cdot \left( \frac{1}{1 - ax} - \frac{1}{1 - bx} \right) = \frac{1}{(a - b)} \cdot \sum_{k \geq 0} (a^k - b^k) \cdot x^k,$$

и искомая формула для  $k$ -того числа Фибоначчи имеет вид

$$u_k = \frac{a^k - b^k}{a - b}, \quad \text{где } a = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad b = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}. \quad (2-4)$$

**2.2. Рекуррентное уравнение  $n$ -того порядка** на последовательность  $a_i$  — это соотношение вида

$$a_k = \alpha_1 a_{k-1} + \alpha_2 a_{k-2} + \dots + \alpha_n a_{k-n}, \quad (2-5)$$

в котором  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  — заданные фиксированные числа (предполагается, что  $\alpha_n \neq 0$ ) и которое выполняется для всех  $k \geq n$ . Соотношение (2-5) выражает  $k$ -тый член последовательности через предыдущие  $n$  членов и однозначно задаёт всю последовательность  $a_k$ , коль скоро известны её первые  $n$  членов  $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ . Решить уравнение (2-5) с начальными условиями  $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$  означает написать формулу, явно выражающую  $a_k$  через  $k$  сразу для всех  $k$ .

Так, формула (2-4) для чисел Фибоначчи решает рекуррентное уравнение второго порядка  $u_k = u_{k-1} + u_{k-2}$  с начальными условиями  $u_0 = 0$ ,  $u_1 = 1$ . Способ, которым мы получили эту формулу, может быть применён для решения любого рекуррентного уравнения (2-5) с произвольными начальными условиями. А именно, переписывая (2-5) в виде

$$a_k - \alpha_1 a_{k-1} - \alpha_2 a_{k-2} - \dots - \alpha_n a_{k-n} = 0 \quad (2-6)$$

и сравнивая это соотношение со второй из формул (1-3) на стр. 2, мы видим, что выполнение рекуррентного соотношения (2-6) равносильно тому, что произведение

$$p(x) = (1 - \alpha_1 x - \alpha_2 x^2 - \dots - \alpha_n x^n) \cdot (a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots) = p_0 + p_1 x + \dots + p_{n-1} x^{n-1} \quad (2-7)$$

является *многочленом* степени не выше  $(n-1)$  — все коэффициенты при степенях  $x^k$  с  $k \geq n$  занулятся в силу соотношения (2-6). Если известны первые  $n$  членов  $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$  последовательности  $a_i$ , многочлен  $p(x)$  без труда вычисляется явным перемножением скобок из (2-7) (причём достаточно учитывать лишь члены степени меньшей  $n$ ). В результате задача отыскания явной формулы для  $a_k$  превращается в задачу явного разложения в ряд рациональной функции

$$\frac{p(x)}{1 - \alpha_1 x - \alpha_2 x^2 - \dots - \alpha_n x^n}. \quad (2-8)$$

Чтобы получить его, разложим знаменатель на множители:

$$1 - \alpha_1 x - \alpha_2 x^2 - \dots - \alpha_n x^n = \prod_{i=1}^n (1 - \lambda_i x) = (1 - \lambda_1 x)(1 - \lambda_2 x) \dots (1 - \lambda_n x), \quad (2-9)$$

Упражнение 2.2. Покажите, что соотношение (2-9) равносильно тому, что числа  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  являются корнями многочлена

$$\chi(t) = t^n - \alpha_1 t^{n-1} - \alpha_2 t^{n-2} - \dots - \alpha_n \quad (2-10)$$

(т. е. удовлетворяют равенству  $\chi(t) = \prod_{i=1}^n (t - \lambda_i)$ ). Многочлен (2-10) называется *характеристическим многочленом* уравнения (2-5).

Рассмотрим вначале случай, когда все числа  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  попарно различны, т. е. когда у характеристического многочлена (2-10) имеется ровно  $n$  различных корней.

Будем действовать как в п° 2.1 — разложим рациональную функцию (2-8) в сумму дробей

$$\frac{p(x)}{(1 - \lambda_1 x)(1 - \lambda_2 x) \dots (1 - \lambda_n x)} = \frac{\beta_1}{1 - \lambda_1 x} + \frac{\beta_2}{1 - \lambda_2 x} + \dots + \frac{\beta_n}{1 - \lambda_n x}, \quad (2-11)$$

числители которых  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$  — некоторые константы, которые мы сейчас подберём. Формула (2-11) равносильна следующему равенству на многочлены степени  $\leq (n-1)$ :

$$p(x) = \sum_{i=1}^n \prod_{\nu \neq i} (1 - \lambda_\nu x) \cdot \beta_i$$

(мы умножили обе части (2-11) на общий знаменатель), и чтобы оно выполнялось тождественно по  $x$ , достаточно добиться его выполнения при каких-нибудь  $n$  различных значениях  $x$ .

Подставляя значения  $x = 1/\lambda_1, 1/\lambda_2, \dots, 1/\lambda_n$ , видим, что (2-11) имеет место при

$$\beta_i = \frac{\lambda_i^{n-1} p(1/\lambda_i)}{\prod_{\nu \neq i} (\lambda_i - \lambda_\nu)} = \frac{p_0 \lambda_i^{n-1} + \dots + p_{n-2} \lambda_i + p_{n-1}}{\prod_{\nu \neq i} (\lambda_i - \lambda_\nu)}, \quad (2-12)$$

где  $p(x) = p_0 + p_1 x + \dots + p_{n-1} x^{n-1}$  — многочлен (2-7). Теперь остаётся только разложить каждую геометрическую прогрессию в правой части (2-11) по формуле

$$\frac{\beta_i}{1 - \lambda_i x} = \beta_i \cdot \sum_{k \geq 0} \lambda_i^k x^k = \beta_i + \beta_i \lambda_i x + \beta_i \lambda_i^2 x^2 + \beta_i \lambda_i^3 x^3 + \dots$$

и сложить полученные разложения:

$$\frac{p(x)}{1 - \alpha_1 x - \alpha_2 x^2 - \dots - \alpha_n x^n} = \sum_{k \geq 0} \left( \beta_1 \lambda_1^k + \beta_2 \lambda_2^k + \dots + \beta_n \lambda_n^k \right) \cdot x^k.$$

Итак, если все  $n$  корней  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  характеристического уравнения

$$t^n - \alpha_1 t^{n-1} - \alpha_2 t^{n-2} - \dots - \alpha_n = 0$$

различны, решением рекуррентного уравнения  $a_k = \alpha_1 a_{k-1} + \alpha_2 a_{k-2} + \dots + \alpha_n a_{k-n}$  является сумма геометрических прогрессий

$$a_k = \beta_1 \lambda_1^k + \beta_2 \lambda_2^k + \dots + \beta_n \lambda_n^k, \quad (2-13)$$

взятых с коэффициентами  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ , которые находятся по формулам (2-12).

Упражнение 2.3. Найдите формулу для  $k$ -го члена последовательности  $a_k$  заданной рекуррентными уравнениями

а)  $a_k = 3 a_{k-1} - 2 a_{k-2}, a_0 = 0, a_1 = 1;$

б)  $a_k = 6 a_{k-1} - 11 a_{k-2} + 6 a_{k-3}, a_0 = 0, a_1 = 1, a_2 = 2.$

В общем случае, когда у характеристического многочлена есть кратные корни, т. е.

$$1 - \alpha_1 x - \alpha_2 x^2 - \dots - \alpha_n x^n = \prod_{i=1}^r (1 - \lambda_i x)^{m_i} = (1 - \lambda_1 x)^{m_1} (1 - \lambda_2 x)^{m_2} \dots (1 - \lambda_r x)^{m_r}$$

(где все  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$  различны и  $m_1 + m_2 + \dots + m_r = n$ ), рациональная функция (2-8) является суммой более сложных дробей:

$$\frac{p(x)}{(1 - \lambda_1 x)^{m_1} (1 - \lambda_2 x)^{m_2} \dots (1 - \lambda_r x)^{m_r}} = \frac{\beta_1(x)}{(1 - \lambda_1 x)^{m_1}} + \frac{\beta_2(x)}{(1 - \lambda_2 x)^{m_2}} + \dots + \frac{\beta_n(x)}{(1 - \lambda_r x)^{m_r}},$$

числители которых  $\beta_i(x)$  являются многочленами степени меньше  $m_i$ . Для их отыскания, а также для разложения в степенной ряд дробей  $\beta(x)/(1 - \lambda x)^m$  требуется понятие *производной*.

### §3. Дифференциальное исчисление рядов.

**3.1. Производная.** Подставим в степенной ряд

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$$

вместо  $x$  сумму  $x + t$ , где  $t$  — ещё одна переменная. Получим ряд от двух переменных

$$f(x + t) = a_0 + a_1(x + t) + a_2(x + t)^2 + \dots$$

Раскроем в нём все скобки и сгруппируем слагаемые по степеням переменной  $t$ ,

$$\begin{aligned} f(x + t) &= a_0 + \\ & a_1 x + a_1 \cdot t + \\ & a_2 x^2 + 2 a_2 x \cdot t + a_2 \cdot t^2 + \\ & a_3 x^3 + 3 a_3 x^2 \cdot t + 3 a_3 x \cdot t^2 + a_3 \cdot t^3 + \\ & \dots \dots \dots \\ & = f(x) + f_1(x) \cdot t + f_2(x) \cdot t^2 + f_3(x) \cdot t^3 + \dots, \end{aligned} \quad (3-1)$$

где через  $f_m(x)$  обозначен ряд, возникающий в качестве коэффициента при  $t^m$ . Ряд  $f_1(x)$ , служащий коэффициентом при первой степени  $t$ , называется *производной* от исходного ряда  $f$  и

обозначается  $f'(x)$ . Итак, производная — это первый, линейный по  $t$ , коэффициент приращения  $f(x+t) - f(x)$ , разложенного по степеням  $t$ :

$$f(x+t) = f(x) + f'(x) \cdot t + (\text{члены, делящиеся на } t^2). \quad (3-2)$$

**3.1.1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ.** Производная от ряда  $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots$  равна

$$f'(x) = \sum_{k \geq 1} k a_k x^{k-1} = a_1 + 2 a_2 x + 3 a_3 x^2 + \dots \quad (3-3)$$

(в частности, производная от константы равна нулю, а производная от многочлена является многочленом на единицу меньшей степени).

Доказательство. Согласно (3-2), ряд  $f'(x)$  — это свободный член ряда  $(f(x+t) - f(x))/t$ , рассматриваемого как ряд от переменной  $t$ , коэффициенты которого являются рядами от  $x$ . Подчеркнём, что отношение  $(f(x+t) - f(x))/t$  действительно является рядом по  $t$ , поскольку  $f(x+t) - f(x)$  делится на  $t$ . Это следует из формулы для разности степеней:

$$\frac{a^k - b^k}{a - b} = \underbrace{a^{k-1} + a^{k-2}b + a^{k-3}b^2 + \dots + ab^{k-2} + b^{k-1}}_{k \text{ слагаемых}}.$$

Полагая в ней  $a = (x+t)$ ,  $b = x$ , получаем

$$\frac{(x+t)^k - x^k}{t} = \underbrace{(x+t)^{k-1} + (x+t)^{k-2}x + (x+t)^{k-3}x^2 + \dots + x^{k-1}}_{k \text{ слагаемых}}, \quad (3-4)$$

откуда

$$\begin{aligned} \frac{f(x+t) - f(x)}{t} &= a_1 \cdot \frac{(x+t) - t}{t} + a_2 \cdot \frac{(x+t)^2 - t^2}{t} + a_3 \cdot \frac{(x+t)^3 - t^3}{t} + \dots = \\ &= \sum_{k \geq 1} a_k \cdot ((x+t)^{k-1} + (x+t)^{k-2}x + (x+t)^{k-3}x^2 + \dots + x^{k-1}). \end{aligned}$$

Свободный член этого ряда, рассматриваемого как ряд от  $t$ , получается подстановкой в него  $t = 0$ . От этого каждая сумма (3-4) превращается в  $kx^{k-1}$ , и мы получаем формулу (3-3).  $\square$

**3.1.2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ.** Для любого числа  $\alpha \in \mathbb{F}$  и любых рядов  $f, g \in \mathbb{F}[[x]]$  справедливы равенства

$$(\alpha f)' = \alpha \cdot f', \quad (f+g)' = f' + g', \quad (fg)' = f' \cdot g + f \cdot g'. \quad (3-5)$$

Кроме того, если ряд  $g$  не имеет свободного члена, то

$$(f(g(x)))' = g'(x) \cdot f'(g(x)), \quad (3-6)$$

а если ряд  $f$  обратим, то  $(1/f)' = -f'/f^2$ .

Доказательство. Первые два равенства в (3-5) вытекают прямо из формулы (3-3). Для доказательства третьего равенства в (3-5) (его обычно называют *правилом Лейбница*) перемножим ряды

$$\begin{aligned} f(x+t) &= f(x) + t \cdot f'(x) + (\text{члены, делящиеся на } t^2) \\ g(x+t) &= g(x) + t \cdot g'(x) + (\text{члены, делящиеся на } t^2). \end{aligned}$$

С точностью до мономов, делящихся на  $t^2$ ,

$$f(x+t)g(x+t) = f(x)g(x) + t \cdot (f'(x)g(x) + f(x)g'(x)) + (\text{члены, делящиеся на } t^2),$$

откуда  $(fg)' = f' \cdot g + f \cdot g'$ .

Правило дифференцирования композиции рядов (3-6) доказывается похожим образом. Подставим в  $f(x)$  вместо  $x$  ряд  $g(x+t)$ :

$$f(g(x+t)) = f(g(x) + t \cdot g'(x) + (\text{члены, делящиеся на } t^2)).$$

Обозначая ряд, который прибавляется к  $g(x)$  в аргументе  $f$ , через

$$\varepsilon(x, t) = t \cdot g'(x) + (\text{члены, делящиеся на } t^2),$$

получаем

$$\begin{aligned} f(g(x+t)) &= f(g(x) + \varepsilon(x, t)) = \\ &= f(g(x)) + \varepsilon(x, t) \cdot f'(g(x)) + (\text{члены, делящиеся на } \varepsilon(x, t)^2) = \\ &= f(g(x)) + t \cdot g'(x) \cdot f'(g(x)) + (\text{члены, делящиеся на } t^2), \end{aligned}$$

откуда  $(f(g(x)))' = g'(x) \cdot f'(g(x))$ .

Для доказательства последней формулы возьмём производные от обеих частей равенства  $f \cdot f^{-1} = 1$ . Получим  $f' \cdot f^{-1} + f \cdot (f^{-1})' = 0$ , откуда  $(f^{-1})' = -f'/f^2$ .  $\square$

**Упражнение 3.1.** Найдите производную от ряда  $1/(1-x)^2$  и напишите явную формулу для  $k$ -го члена последовательности  $a_k$ , заданной рекуррентным соотношением:  $a_0 = 1$ ,  $a_1 = -1$  и  $a_k = 2a_{k-1} - a_{k-2}$  при  $k \geq 2$ .

**3.2. Первообразный ряд.** Из формулы для производной (3-3) вытекает, что для любого ряда

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$$

существует единственный ряд без свободного члена, производная от которого равна  $f(x)$ . Он называется *первообразным рядом* или *интегралом* от  $f$  и обозначается

$$\int f(x) dx \stackrel{\text{def}}{=} a_0 x + \frac{a_1}{2} x^2 + \frac{a_2}{3} x^3 + \dots = \sum_{k \geq 1} \frac{a_{k-1}}{k} x^k. \quad (3-7)$$

**3.3. Логарифм.** Первообразный ряд от знакопеременной геометрической прогрессии называется *логарифмом* и обозначается

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &\stackrel{\text{def}}{=} \int \frac{dx}{1+x} = \int (1 - x + x^2 - x^3 + \dots) dx = \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \dots = \sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k. \end{aligned} \quad (3-8)$$

Вместо  $1+x$  в логарифм можно подставить любой ряд  $u(x)$  с единичным свободным членом — ряд  $\ln(u(x))$  получается подстановкой в правую часть (3-8) вместо  $x$  ряда  $u(x) - 1$  без свободного члена, что является, как мы видели в (п° 1.2), алгебраической операцией.

**Упражнение 3.2.** Выведите из формулы (3-6) для производной сложной функции, что для любого ряда  $u$  с единичным свободным членом  $(\ln u)' = u'/u$  (правая часть этого равенства называется *логарифмической производной* от ряда  $u$ ).

Обозначим множество всех рядов без свободного члена через  $\mathcal{N} \subset \mathbb{F}[[x]]$ , а множество всех рядов с единичным свободным членом — через  $\mathcal{U} \subset \mathbb{F}[[x]]$ . Множество  $\mathcal{N}$  содержит нулевой ряд  $f(x) = 0$  и замкнуто относительно операций сложения и вычитания рядов, а множество  $\mathcal{U}$  содержит единичный ряд  $f(x) = 1$  и замкнуто относительно операций умножения и деления рядов (все ряды с единичным свободным членом обратимы и на них можно делить).

Операция *логарифмирования*, переводящая ряд  $u(x) \in \mathcal{U}$  в ряд  $\ln(u(x)) \in \mathcal{N}$ , является алгебраической и задаёт отображение

$$\log : \mathcal{U} \xrightarrow{u \mapsto \ln u} \mathcal{N}. \quad (3-9)$$

Мы собираемся показать, что это отображение взаимно однозначно и переводит умножение рядов в  $\mathcal{U}$  в сложение рядов в  $\mathcal{N}$  и наоборот. Для этого нам понадобится отображение, обратное к логарифмированию.

**3.4. Экспонента. Ряд**

$$e^x \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k \geq 0} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{120} + \dots \tag{3-10}$$

называется *экспонентой*. Этот ряд замечателен тем, что он совпадает со своей производной.

Упражнение 3.3. Убедитесь в том, что  $f(x) = e^x$  — это *единственный* ряд со свободным членом единица, удовлетворяющий дифференциальному уравнению  $f'(x) = f(x)$ .

Подставляя в (3-10) вместо  $x$  любой ряд  $\tau(x)$  без свободного члена, мы получаем ряд  $e^{\tau(x)}$  со свободным членом 1, который называется *экспонентой* ряда  $\tau(x)$ . Таким образом, возникает экспоненциальное отображение

$$\exp : \mathcal{N} \xrightarrow{\tau \mapsto e^\tau} \mathcal{U} . \tag{3-11}$$

**3.4.1. ТЕОРЕМА.** *Экспоненциальное и логарифмическое отображения (3-11) и (3-9) обратны друг другу и переводят сложение рядов с нулевым свободным членом в умножение рядов с единичным свободным членом, т. е. для любых рядов  $u, u_1, u_2 \in \mathcal{U}$  и  $\tau, \tau_1, \tau_2 \in \mathcal{N}$  выполняются тождества:  $\ln e^\tau = \tau$ ,  $e^{\ln u} = u$ ,  $\ln(u_1 u_2) = \ln(u_1) + \ln(u_2)$ ,  $e^{\tau_1 + \tau_2} = e^{\tau_1} e^{\tau_2}$ .*

Доказательство. Заметим, что для любых двух рядов  $f$  и  $g$  с одинаковыми свободными членами равенства  $f = g$  и  $f' = g'$  равносильны, поэтому для совпадения таких рядов достаточно проверить совпадение их производных, что мы и будем делать. Ряды  $\ln(e^x)$  и  $x$  оба имеют нулевой свободный член и одинаковые производные:

$$\ln(e^x)' = \frac{(e^x)'}{e^x} = \frac{e^x}{e^x} = 1 = x' .$$

Поэтому  $\ln(e^x) = x$ . Подставляя в это равенство вместо  $x$  любой ряд  $\tau(x)$  без свободного члена, получаем

$$\ln e^\tau = \tau \quad \forall \tau \in \mathcal{N} .$$

Далее, для любых рядов  $u_1, u_2 \in \mathcal{U}$  ряды  $\ln(u_1 u_2)$  и  $\ln u_1 + \ln u_2$  оба имеют нулевой свободный член и одинаковые производные:

$$(\ln(u_1 u_2))' = \frac{(u_1 u_2)'}{u_1 u_2} = \frac{u_1' u_2 + u_1 u_2'}{u_1 u_2} = \frac{u_1'}{u_1} + \frac{u_2'}{u_2} = (\ln u_1)' + (\ln u_2)' = (\ln u_1 + \ln u_2)' .$$

Поэтому  $\ln(u_1 u_2) = \ln u_1 + \ln u_2$ . Таким образом, логарифмирование  $\mathcal{U} \xrightarrow{\log} \mathcal{N}$  переводит умножение рядов в  $\mathcal{U}$  в сложение рядов  $\mathcal{N}$  и является отображением «на»: любой ряд  $\tau \in \mathcal{N}$  является логарифмом от ряда  $e^\tau \in \mathcal{U}$ . Остаётся показать, что разные ряды

$$u_1(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots \quad \text{и} \quad u_2(x) = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \dots$$

из  $\mathcal{U}$  имеют разные логарифмы. Если  $\ln(u_1) = \ln(u_2)$ , то производная  $\ln(u_1)' = u_1'/u_1$  равна производной  $\ln(u_2)' = u_2'/u_2$ , т. е.  $u_1(x)' \cdot u_2(x) = u_2'(x) \cdot u_1(x)$ . Сравнивая в этом равенстве коэффициенты при одинаковых степенях  $x$  получаем соотношения

$$\begin{aligned} a_1 \cdot 1 &= 1 \cdot b_1 \\ 2a_2 + a_1 b_1 &= a_1 b_1 + 2b_2 \\ &\dots \dots \dots \\ k \cdot a_k + \sum_{m=1}^{k-1} m \cdot a_m b_{k-m-1} &= \sum_{m=1}^{k-1} (k-m) \cdot a_{m-1} b_{k-m} + k \cdot b_k \\ &\dots \dots \dots \end{aligned}$$

из которых последовательно вытекает, что  $a_k = b_k$  для всех  $k$ , т. е.  $u_1(x) = u_2(x)$ . □

Упражнение 3.4. Покажите, что  $\forall u \in \mathcal{U} \quad \ln(1/u) = -u$ .

## §4. Бином Ньютона.

**4.1. Степень с произвольным показателем.** Для любого числа  $\alpha \in \mathbb{F}$  определим *биномиальный ряд* с показателем  $\alpha$  формулой

$$(1+x)^\alpha \stackrel{\text{def}}{=} e^{\alpha \ln(1+x)}.$$

Подставляя вместо  $1+x$  произвольные ряды  $u(x)$  с единичным свободным членом<sup>1</sup> мы получаем на множестве рядов с единичным свободным членом алгебраическую операцию *возведения в  $\alpha$ -тую степень*

$$\mathcal{U} \xrightarrow{u \mapsto u^\alpha = e^{\alpha \ln u}} \mathcal{U},$$

определённую для любого числа  $\alpha \in \mathbb{F}$ . Эта операция обладает всеми интуитивно ожидаемыми от возведения в степень свойствами: для любых рядов  $u, v \in \mathcal{U}$  и чисел  $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$  выполняются равенства

$$u^\alpha \cdot u^\beta = u^{\alpha+\beta}, \quad (u^\alpha)^\beta = u^{\alpha\beta}, \quad (uv)^\alpha = u^\alpha v^\alpha. \quad (4-1)$$

Упражнение 4.1. Выведите эти свойства из установленных в теореме (п° 3.4.1) свойств экспоненты и логарифма.

**4.2. Биномиальные коэффициенты.** Чтобы отыскать явные значения коэффициентов бинома

$$(1+x)^\alpha = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots,$$

вычислим его логарифмическую производную (см. упр. 3.2):

$$\frac{((1+x)^\alpha)'}{(1+x)^\alpha} = (\ln(1+x)^\alpha)' = (\ln e^{\alpha \ln(1+x)})' = (\alpha \ln(1+x))' = \frac{\alpha}{1+x}.$$

Приводя левую и правую часть к общему знаменателю, получаем соотношение

$$(a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots)' \cdot (1+x) = \alpha \cdot (a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots).$$

Сравнение коэффициентов при  $x^{k-1}$  в правой и левой части этого равенства даёт соотношения

$$ka_k + (k-1)a_{k-1} = \alpha a_{k-1},$$

из которых последовательно получаем искомую формулу (напомним, что  $a_0 = 1$ ):

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{\alpha - (k-1)}{k} \cdot a_{k-1} = \frac{(\alpha - (k-1))(\alpha - (k-2))}{k(k-1)} \cdot a_{k-2} = \dots \\ &\dots = \frac{(\alpha - (k-1))(\alpha - (k-2)) \dots (\alpha - 1)\alpha}{k!}. \end{aligned}$$

Стоящая в правой части дробь имеет в числителе и в знаменателе по  $k$  множителей, представляющих собою числа, последовательно уменьшающиеся на единицу: в знаменателе — от  $k$  до 1, в числителе — от  $\alpha$  до  $(\alpha - k + 1)$ . Эта дробь называется *биномиальным коэффициентом* и обозначается

$$\binom{\alpha}{k} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!} \quad (4-2)$$

Нами доказана

<sup>1</sup>что, как и выше, в случае логарифмирования, означает подстановку вместо  $x$  ряда  $u(x) - 1$  без свободного члена, что является алгебраической операцией

**4.2.1. ТЕОРЕМА (ФОРМУЛА НЬЮТОНА).** Для любого числа  $\alpha \in \mathbb{F}$  имеется разложение

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k \geq 0} \binom{\alpha}{k} x^k = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{6} x^3 + \dots$$

□

**4.3. Бином с натуральным показателем.** При натуральном значении показателя  $\alpha = n \in \mathbb{N}$  имеется лишь конечное число ненулевых биномиальных коэффициентов, поскольку при  $k > n$  в числителе (4-2) образуется нулевой множитель. Поэтому разложение бинома с натуральным показателем конечно:

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2} x^2 + \dots + x^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot x^k,$$

а сами биномиальные коэффициенты в этом случае симметричны относительно замены  $k$  на  $n-k$ :

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!} = \frac{n(n-1)\dots(k+1)}{(n-k)!} = \binom{n}{n-k}$$

Упражнение 4.2. Покажите, что это число равно количеству  $n$ -буквенных слов, которые можно написать  $k$  буквами  $a$  и  $(n-k)$  буквами  $b$  (в частности, оно является *целым*, что не вполне очевидно).

**4.4. Биномы с отрицательными и рациональными показателями.** При  $\alpha \notin \mathbb{N}$  биномиальный ряд имеет бесконечно много ненулевых коэффициентов. Например, для целой отрицательной степени  $\alpha = -m$ ,  $m \in \mathbb{N}$ , мы получаем разложение

$$\frac{1}{(1+x)^m} = 1 - mx + \frac{m(m+1)}{2} x^2 - \frac{m(m+1)(m+2)}{6} x^3 + \dots = \sum_{k \geq 0} (-1)^k \binom{m+k}{k} \cdot x^k,$$

которое позволяет решать рекуррентные уравнений с кратными корнями характеристического многочлена, обсуждавшиеся в конце §2.

При нецелых рациональных показателях формула Ньютона даёт ряд, который при алгебраических вычислениях ведёт себя как радикал. Например, при  $\alpha = 1/n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , мы получаем разложение

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{1+x} &= 1 + \frac{1}{n} x + \frac{\frac{1}{n}(\frac{1}{n}-1)}{2} x^2 + \frac{\frac{1}{n}(\frac{1}{n}-1)(\frac{1}{n}-2)}{6} x^3 + \dots = \\ &= 1 + \frac{x}{n} - \frac{n-1}{2} \cdot \frac{x^2}{n^2} + \frac{(n-1)(2n-1)}{2 \cdot 3} \cdot \frac{x^3}{n^3} - \frac{(n-1)(2n-1)(3n-1)}{2 \cdot 3 \cdot 4} \cdot \frac{x^4}{n^4} + \dots \end{aligned}$$

При  $n = 2$  в качестве коэффициента при  $x^k$  мы получаем дробь вида

$$(-1)^{k-1} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2k-3)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2k)} = \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} \cdot \frac{(2k)!}{(2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2k))^2} = \frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1) \cdot 4^k} \cdot \binom{2k}{k}.$$

Таким образом,

$$\sqrt{1+x} = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} \cdot \binom{2k}{k} \cdot \frac{x^k}{4^k}. \quad (4-3)$$

**4.5. Числа Каталана.** Воспользуемся разложением (4-3) для получения явной формулы для одной часто возникающей в комбинаторных задачах последовательности чисел. Пусть при вычислении суммы  $(n+1)$  слагаемых

$$a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_n \quad (\text{всего } n \text{ плюсов}) \quad (4-4)$$

в каждый момент времени разрешается делать не более одного сложения. Такое вычисление разбивается на  $n$  последовательных шагов, на каждом которых выполняется некоторое конкретное сложение, в результате чего все знаки «+» окажутся занумерованными в том порядке, в котором они выполняются. Количество всех возникающих таким способом нумераций  $n$  плюсов называется  $n$ -ым числом Каталана  $c_n$ . Отметим, что рассматриваемые нумерации отнюдь не произвольны.

Упражнение 4.3. Простым перебором убедитесь, что  $c_1 = 1$ ,  $c_2 = 2$ ,  $c_3 = 5$ ,  $c_4 = 14$  (т. е.  $c_n \neq n!$ )

Количество способов вычислить сумму (4-4), при которых последним выполняется  $i$ -тый слева плюс, равно  $c_{i-1}c_{n-i-1}$ , где для единообразия записи мы полагаем  $c_0 = 1$ . Поэтому числа Каталана  $c_n$  удовлетворяют соотношению

$$c_n = c_0c_{n-1} + c_1c_{n-2} + \dots + c_{n-2}c_1 + c_{n-1}c_0, \quad (4-5)$$

$k$ -тое слагаемое которого учитывает все вычисления, в которых последним выполняется  $k$ -тый, считая слева, плюс в записи (4-4). Чтобы выразить  $c_n$  через  $n$  явно, образуем степенной ряд

$$c(x) = \sum_{k \geq 0} c_k x^k = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + \dots$$

Равенство (4-5) означает, что этот ряд удовлетворяет соотношению<sup>1</sup>

$$\frac{c(x) - 1}{x} = c(x)^2.$$

Иначе говоря,  $c(x)$  является решением следующего квадратного уравнения на неизвестную  $t$ :

$$x \cdot t^2 - t - 1 = 0.$$

По стандартной школьной формуле находим<sup>2</sup>  $c(x) = (1 - \sqrt{1 - 4x}) / (2x)$ . По (4-3)

$$\sqrt{1 - 4x} = - \sum_{k \geq 0} \frac{1}{2k - 1} \cdot \binom{2k}{k} \cdot x^k,$$

откуда

$$c_k = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2k + 1} \cdot \binom{2k + 2}{k + 1} = \frac{1}{k + 1} \cdot \binom{2k}{k}.$$

Отметим, что с первого взгляда снова не очевидно, что это число — целое.

Упражнение 4.4. В выпуклом  $n$  угольнике проводят максимально возможное число диагоналей так, чтобы они не пересекались нигде, кроме вершин. Сколькими способами это можно сделать?

<sup>1</sup>формула (4-5) выражает равенство коэффициентов при  $x^n$  в левой и правой части этого соотношения

<sup>2</sup>обратите внимание, что ряд  $1 - \sqrt{1 - 4x}$  не имеет свободного члена и потому делится в  $\mathbb{Q}[[x]]$  на  $2x$ , причём частное имеет свободный член  $c_0 = 1$ , как нам и требуется; второе решение  $\frac{1 + \sqrt{1 - 4x}}{2x}$  не является «целым» степенным рядом: знаменатель не обратим, а числитель, имея ненулевой свободный член, на него не делится

## §5. Вычисление степенных сумм.

**5.1. Задача Бернулли.** В работе «Ars Conjectandi» Яков Бернулли не без гордости отмечал<sup>1</sup>, что сумел просуммировать десятые степени первой тысячи натуральных чисел менее, чем за половину четверти часа. Речь идёт о вычислении суммы  $1^{10} + 2^{10} + 3^{10} + \dots + 1000^{10}$ , которое Бернулли проделал при помощи открытой им формулы, выражающей сумму

$$S_m(n) = 0^m + 1^m + 2^m + 3^m + \dots + n^m = \sum_{k=0}^n k^m \quad (5-1)$$

в виде многочлена  $(m+1)$ -ой степени от  $n$ .

Многочлены  $S_0(n) = n$  и  $S_1(n) = n(n+1)/2$ , дающие решение этой задачи для первых двух значений степени  $m=0$  и  $m=1$ , вероятно, хорошо знакомы читателю:

$$S_0(n) = \underbrace{1 + 1 + 1 + \dots + 1}_{n \text{ раз}} = n,$$

$$S_1(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + n = n(n+1)/2.$$

Следующие два многочлена, решающие задачу для  $m=2, 3$ , пожалуй, уже менее известны:

$$S_2(n) = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = n(n+1)(2n+1)/6,$$

$$S_3(n) = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = n^2(n+1)^2/4 = S_1(n)^2.$$

Предлагаемый ниже способ отыскания многочлена  $S_m(t)$ , значение которого при целых неотрицательных  $t = n$  равно сумме (5-1), основывается на возможности записывать некоторые отображения  $\mathbb{Q}[t] \longrightarrow \mathbb{Q}[t]$ , из множества многочленов в себя, в виде степенных рядов от оператора дифференцирования.

**5.2. Разностные операторы на пространстве многочленов.** Отображение

$$D : \mathbb{Q}[t] \xrightarrow{p(t) \mapsto p'(t)} \mathbb{Q}[t],$$

сопоставляющее каждому многочлену  $p(t)$  его производную  $p'(t)$ , называется *оператором дифференцирования*. Согласно предложению (п° 3.1.2) сам оператор  $D$  и любая его степень  $D^k = D \circ D \circ \dots \circ D$ , переводящая многочлен  $p$  в его  $k$ -тую производную  $D^k p(t)$ , перестановочны со сложением многочленов и умножением многочленов на числа, т. е.

$$D^k(\alpha \cdot p(t) + \beta \cdot q(t)) = \alpha \cdot D^k p(t) + \beta \cdot D^k q(t) \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{Q} \text{ и } \forall p, q \in \mathbb{Q}[t].$$

Оператор  $D$  можно подставить вместо переменной  $x$  в любой степенной ряд

$$f(x) = \sum_{k \geq 0} a_k x^k \in \mathbb{Q}[[x]].$$

В результате получится отображение  $f(D) : \mathbb{Q}[t] \longrightarrow \mathbb{Q}[t]$ , переводящее многочлен  $p \in \mathbb{Q}[t]$  в

$$f(D)p = (a_0 + a_1 D + a_2 D^2 + \dots)p = a_0 \cdot p + a_1 \cdot Dp + a_2 \cdot D^2 p + \dots = \sum_{k \geq 0} a_k \cdot D^k p.$$

Поскольку каждое применение  $D$  к многочлену уменьшает его степень на единицу, все производные  $D^k p$  с  $k > \deg p$  в правой части этого равенства<sup>2</sup> обращаются в нуль, и сумма состоит

<sup>1</sup>сочинение «Ars Conjectandi» было опубликовано в 1713 уже после смерти Якова Бернулли (1654–1705)

<sup>2</sup>для единообразия записи мы полагаем в ней  $D^0 p \stackrel{\text{def}}{=} p$

из конечного числа ненулевых слагаемых, т. е. правая часть равенства является многочленом, который можно полностью вычислить конечным числом арифметических действий.

Отображение  $\mathbb{Q}[t] \longrightarrow \mathbb{Q}[t]$ , представимое в виде  $f(D)$  для какого-нибудь ряда  $f(x) \in \mathbb{Q}[[x]]$ , называется *разностным оператором* на пространстве многочленов. Разностные операторы замечательны тем, что для вычисления их композиции достаточно просто перемножить соответствующие ряды:

$$f(D) \circ g(D) = p(D), \quad \text{где } p(x) = f(x)g(x) \text{ в } \mathbb{Q}[[x]].$$

В частности, любые два разностных оператора перестановочны друг с другом:

$$f(D) \circ g(D) = g(D) \circ f(D).$$

**Упражнение 5.1.** Проверьте, что любой разностный оператор  $f(D)$  перестановочен со сложением многочленов и умножением многочленов на числа, т. е.

$$f(D)(\alpha \cdot p(t) + \beta \cdot q(t)) = \alpha \cdot f(D)p(t) + \beta \cdot f(D)q(t) \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{Q} \text{ и } \forall p, q \in \mathbb{Q}[t].$$

**5.3. Операторы сдвига аргумента.** Из упр. 5.1 вытекает, что для вычисления значения оператора  $f(D)$  на произвольном многочлене  $p(t) = p_0 + p_1t + \dots + p_nt^n$  достаточно уметь вычислять значение оператора  $f(D)$  на всех одночленах  $t^m$ . Воспользуемся этим для явного описания действия на  $\mathbb{Q}[t]$  экспоненты

$$e^D = 1 + D + \frac{1}{2}D^2 + \frac{1}{6}D^3 + \dots$$

Поскольку  $D^k t^m = m(m-1) \dots (m-k+1) \cdot t^{m-k}$ , из формулы бинома с натуральным показателем (см. (п° 4.3)) мы заключаем, что

$$e^D t^m = \sum_{k \geq 0} \frac{1}{k!} D^k t^m = \sum_{k \geq 0} \frac{m(m-1) \dots (m-k+1)}{k!} t^{m-k} = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} t^{m-k} = (t+1)^m.$$

Следовательно, оператор  $e^D$  переводит любой многочлен  $p(t)$  в  $e^D p(t) = p(t+1)$ , т. е. сдвигает переменную  $t$  на единицу.

Аналогичным образом, оператор  $e^{-D}$  переводит любой многочлен  $p(t)$  в многочлен

$$e^{-D} p(t) = p(t-1),$$

получающийся из  $p(t)$  сдвигом аргумента на единицу в противоположную сторону.

**Упражнение 5.2.** Убедитесь в этом, повторив предыдущее вычисление с надлежащими изменениями знаков.

Другой способ удостовериться в этом таков: поскольку ряды  $e^x$  и  $e^{-x}$  обратны друг другу, операторы  $e^D$  и  $e^{-D}$  тоже обратны друг другу, а отображение, обратное к сдвигу аргумента, это противоположный сдвиг аргумента.

**5.4. Решение задачи Бернулли при помощи ряда Тодда.** Рассмотрим отображение<sup>1</sup>

$$\nabla = 1 - e^{-D} : \mathbb{Q}[t] \xrightarrow{p(t) \mapsto p(t) - p(t-1)} \mathbb{Q}[t]$$

которое получается подстановкой  $x = D$  в ряд  $1 - e^{-x} \in \mathbb{Q}[[x]]$  и переводит многочлен  $p(t)$  в разность  $\nabla p(t) = p(t) - p(t-1)$ . Пусть многочлен  $S_m(t) \in \mathbb{Q}[t]$  решает задачу Бернулли для показателя  $m$ , т. е. удовлетворяет при всех целых неотрицательных  $t = n$  соотношению

$$S_m(n) = 0^m + 1^m + 2^m + 3^m + \dots + n^m.$$

Тогда  $\nabla S_m(t) = t^m$ .

<sup>1</sup>символ  $\nabla$  читается «набла»

Если бы нам удалось найти в  $\mathbb{Q}[[x]]$  ряд  $f(x)$ , обратный к ряду  $1 - e^{-x}$ , то применяя разностный оператор  $f(D)$  к обеим частям равенства  $\nabla S_m(t) = t^m$ , мы — в силу равенства  $f(D) \circ \nabla = 1$  — получили бы для  $S_m(t)$  явную формулу  $S_m(t) = f(D)t^m$ .

К сожалению, ряд  $1 - e^{-x}$  имеет нулевой свободный член, и поэтому не обратим. Но не будем отчаиваться — вынесем из  $1 - e^{-x}$  препятствующий обратимости множитель  $x$ , переписав этот ряд в виде произведения

$$1 - e^{-x} = \frac{1 - e^{-x}}{x} \cdot x.$$

Ряд  $(1 - e^{-x})/x$  обратим, поскольку его свободный член равен 1. Обратный к нему ряд

$$\text{td}(x) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{x}{1 - e^{-x}} \in \mathbb{Q}[[x]].$$

называется *рядом Тодда*. Из равенства  $\text{td}(x) \cdot (1 - e^{-x}) = x$  вытекает соотношение  $\text{td}(D) \circ \nabla = D$ , которое позволяет найти производную от искомого нами многочлена  $S_m(t)$ :

$$S'_m(t) = DS_m(t) = \text{td}(D)\nabla S_m(t) = \text{td}(D)t^m.$$

Поскольку  $S_m(0) = 0$ , многочлен  $S_m(t)$  не имеет свободного члена и находится интегрированием  $\text{td}(D)t^m$  по формуле из п° 3.2.

Итак, для отыскания  $S_m(t)$  достаточно знать первые  $(m + 1)$  коэффициентов ряда  $\text{td}(x)$ . Ряд Тодда принято писать «в экспоненциальной форме», вынося из коэффициентов обратные факториалы:

$$\text{td}(x) = \sum_{k \geq 0} \frac{a_k}{k!} x^k \tag{5-2}$$

В терминах чисел  $a_k$  ответ на задачу Бернулли даётся формулой

$$\begin{aligned} S_m(t) &= \int \left( \sum_{k=0}^m \frac{a_k}{k!} D^k t^m \right) dt = \int \left( \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} a_k t^{m-k} \right) dt = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} \frac{a_k t^{m-k+1}}{m-k+1} = \\ &= \frac{1}{m+1} \left( \binom{m+1}{1} a_m t + \binom{m+1}{2} a_{m-1} t^2 + \dots + \binom{m+1}{m} a_1 t^m + \binom{m+1}{m+1} a_0 t^{m+1} \right), \end{aligned}$$

которую часто представляют в символическом виде

$$(m+1) \cdot S_m(t) = (a \downarrow + t)^{m+1} - a_{m+1}$$

(стрелка у  $a \downarrow$  предписывает при раскрытии бинома  $(a + t)^{m+1}$  вместо  $a^k$  писать  $a_k$ ).

Упражнение 5.3. Попробуйте повторить достижение Бернулли — найдите  $a_0, a_1, \dots, a_{10}$  из соотношения

$$\left( a_0 + a_1 x + \frac{a_2}{2} x^2 + \frac{a_3}{6} x^3 + \frac{a_4}{24} x^4 + \dots \right) \cdot \left( 1 - \frac{1}{2} x + \frac{1}{6} x^2 - \frac{1}{24} x^3 + \dots \right) = 1$$

(см. формулы (1-6) на стр. 3), выпишите многочлен  $S_{10}(t)$  и подставьте в него<sup>1</sup>  $t = 1000$ . В качестве «утешительного» результата напишите явные формулы для  $S_4(n)$  и  $S_5(n)$  (сверить полученные Вами значения  $a_0, a_1, \dots, a_{10}$  можно в сноске (2)).

**5.5. Нечётная составляющая ряда Тодда.** При решении предыдущей задачи возникает ощущение, что все коэффициенты  $a_k$  с нечётными номерами  $k \geq 3$  равны нулю. Докажем это.

Ряд  $\frac{1}{2}(\text{td}(x) - \text{td}(-x))$  не содержит чётных степеней  $x$ , а при нечётных степенях имеет те же коэффициенты, что и ряд  $\text{td}(x)$ . Поскольку

$$\text{td}(x) - \text{td}(-x) = \frac{x}{1 - e^{-x}} + \frac{x}{1 - e^x} = \frac{2x - x \cdot (e^x + e^{-x})}{(1 - e^{-x}) \cdot (1 - e^x)} = x,$$

<sup>1</sup>напомню, у Бернулли на всё это ушло около 7 минут, и калькуляторов в те годы ещё не было

<sup>2</sup> $0 = 11v \cdot \frac{99}{9} = 01v \cdot 0 = 6v \cdot \frac{08}{1} = 8v \cdot 0 = 2v \cdot \frac{27}{1} = 9v \cdot 0 = 9v \cdot \frac{08}{1} = 7v \cdot 0 = 8v \cdot \frac{9}{1} = 7v \cdot \frac{6}{1} = 1v \cdot 1 = 0v$

единственный член нечётной степени в ряде Тодда — это  $x/2$ .

**5.6. Числа Бернулли.** Название «ряд Тодда» вошло в обиход лишь во второй половине XX века после работ Тодда, Хирцебруха и Гротендика по топологии и алгебраической геометрии, в которых ряд  $td(x)$  сыграл важную роль в формулировке и доказательстве теоремы Риана–Роха. Во времена Бернулли и Эйлера предпочитали пользоваться рядом

$$td(-x) = \frac{x}{e^x - 1},$$

который, как мы видели выше, отличается от  $td(x)$  ровно одним членом (имеет  $-x/2$  вместо  $x/2$ ). Записывали его тоже в «экспоненциальном виде»:

$$\frac{x}{e^x - 1} = \sum_{k \geq 0} \frac{B_k}{k!} x^k.$$

Коэффициенты  $B_k$  этого разложения называются *числами Бернулли*. При  $k \neq 1$   $B_k = a_k$  (и обращаются в нуль при всех нечётных  $k \geq 3$ ), а  $B_1 = -a_1 = -1/2$ .

Со времён своего открытия Яковом Бернулли, числа  $B_k$  притягивают интерес исследователей. Им посвящена обширная литература, начать знакомиться с которой я советую с книг:

*К. Айрлэнд, М. Роузен. Классическое введение в современную теорию чисел* (гл. 15).

*З. И. Борович, И. Р. Шафаревич. Теория чисел* (§ 8 гл. V).

Имеется даже специальный интернет-ресурс <http://www.bernoulli.org/>, где читатель найдёт массу дополнительной информации, дальнейшие ссылки и программу, вычисляющую числа  $B_k$  в виде несократимых рациональных дробей. В заключение отметим, что не смотря на огромное количество красивых теорем о числах Бернулли, никакой внятной формулы, явно выражающей  $B_n$  через  $n$  нет, и любой содержательный новый взгляд в этом направлении явился бы ярким достижением.

Упражнение 5.4. Получите для чисел Бернулли рекурсивную формулу

$$(n+1)B_n = - \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n+1}{k} \cdot B_k.$$

Упражнение 5.5\*. Докажите, что числа Бернулли с чётными номерами имеют чередующиеся знаки.